


Continue



Meclizina/Piridoxina, son dos fármacos que aunque se utilizan en conjunto como antiemético, antinauseoso así como para el controlar el vértigo. Nombres comerciales: Bonadoxina / Meclison Nombre genérico: Meclizina/Piridoxina. Presentaciones y Vía de Administración: Tabletas, jarabe, solución y solución inyectable para administración oral e intramuscular. Su uso más frecuente es para: Aliviar las náuseas, los vómitos y el vértigo. Más específicamente, este fármaco se aplica para aliviar: Náuseas: es una sensación desagradable de origen estomacal que suele presentarse antes del vomito. Vómitos: que consiste en la expulsión de contenido estomacal a través de la boca. Vértigo: es la sensación subjetiva de que todo el entorno se mueve Cinetosis: es la sensación de mareo provocada por el movimiento, generalmente se presenta en el embarazo, durante viajes, o como consecuencia de algunos medicamentos. Sus efectos son logrados gracias a que la Meclizina pertenece a un grupo de medicamentos antihistamínicos, que a pesar de que su uso principal es de antialérgico, tiene capacidad para regular los centros cerebrales que controlan los mareos, náuseas y vértigo. Por otro lado la Piridoxina o vitamina B6 es un complemento dietético cuyo déficit puede contribuir a las náuseas durante el embarazo. l/h3Meclizina/Piridoxina Precio/h3 Para encontrar el mejor precio compara varias farmacias en nuestra próxima sección. Precio de Meclizina/Piridoxina Farmacia San Pablo Farmatodo Superama Farmacia del Niño Tabletas \$199.00 \$199.00 \$198.00 \$273.89 Jarabe \$232.00 \$220.00 \$231.00 \$286.62 **Es importante aclarar que estos precios fueron tomados de la farmacia en línea en una investigación hecha por el equipo de quefarmacia en Febrero 2020, los precios pueden modificarse con el tiempo y la sucursal de la farmacia.** Tanto en Farmatodo como en Superama tendrás la oportunidad de ahorrar algo de dinero en tu compra, ya que estas farmacias te ofrecen el precio más bajo para dos de las presentaciones de este medicamento con mayor demanda. Por otro lado, Farmacia del Niño ofrece unos costos más elevados que van desde un 30% en adelante. Presentaciones y forma de administración Meclizina + Piridoxina está disponible en presentaciones de administración oral en genérico de varios laboratorios y en las marcas comerciales de Bonadoxina y Meclison. Tabletas de 25 mg/50 mg. en caja de 10 y 25 piezas disponible en genérico de varios laboratorios y como Bonadoxina por laboratorios Pfizer, meclison de Laboratorios Son’ s . Jarabe en cajas con frasco de 60 y 120 ml Disponible en caja de 10 y 25 piezas disponible en genérico de varios laboratorios y en las marcas comerciales de Bonadoxina por laboratorios Pfizer, meclison de Laboratorios Son’ s. Solución en frasco gotero de 20 ml. Disponible en caja de 10 y 25 piezas disponible en genérico de varios laboratorios y como Bonadoxina por laboratorios Pfizer, meclison de Laboratorios Son’ s. Solución inyectable de 1 ml en caja con 5 ampolletas. Disponible en caja de 10 y 25 piezas disponible en genérico de varios laboratorios y como Bonadoxina por laboratorios Pfizer, meclison de Laboratorios Son’ s. Dosis y usos recomendados por edad Presentación Niños Adultos Veces al día Tabletas 1 tab 1-2 1 Jarabe 1.5 – 10 ml No 2-3 Solución 0.5 -3 ml No 2-3 Solución inyectable No 25-100mg ** USO Y DOSIS DEBE SER SIEMPRE RECETADA POR UN MEDICO ** Medicamento en niños: este medicamento puede ser utilizado en niños, por lo que se encuentra disponibles las presentaciones jarabe y solución, mientras que el uso de las tabletas solo es recomendable son recomendadas para mayores de 8 años. Para garantizar sus efectos es necesario que consuma las tabletas enteras con abundante agua; mientras que la solución inyectable solo debe usarse por vía intramuscular. En casos de mareos por movimiento, se recomienda que consuma el medicamento al menos una hora antes del viaje y si es necesario, repetir la dosis un día después. Los pacientes que reciben tratamiento con radioterapia, pueden consumir meclizina + piridoxina una hora antes de la sesión. Generales: Es importante evitar el consumo de Meclizina/Piridoxina en pacientes con insuficiencia renal o hepática severa. Alergias o hipersensibilidad: El medicamento no debe ser consumido por aquellas personas que hayan presentado alergias al Meclizina o Piridoxina así como a medicamentos de composición similar. Mezcla con alcohol: No se recomienda mezclar Meclizina/Piridoxina con alcohol, ya que puede aumentar los efectos secundarios, principalmente la somnolencia. Los componentes de Meclizina/Piridoxina pueden interactuar con los medicamentos anticonvulsivantes como el fenobarbital lo que potencia su efecto sedante. Combinación de Meclizina/Piridoxina en embarazo y lactancia EMBARAZO ALTO LACTANCIA BAJO RIESGO BAJO El La administración Meclizina/Piridoxina implica un Riesgo durante el embarazo, ya que existen estudios que demuestran que la Meclizina puede causar malformaciones en el feto. El uso de Meclizina/Piridoxina está permitido durante la lactancia materna, ya que se ha demostrado que el uso Meclizina en la dosis adecuada no influye perjudicialmente en la calidad o cantidad de la leche materna. Sin embargo, al estar la Piridoxina o vitamina B6 no presenta ningún tipo de efecto perjudicial para la madre o el bebé. Efectos secundarios Según los estudios realizados hasta la fecha ha aparecido efectos adversos en aproximadamente 1 de cada 100 personas, los cuales han sido leves y transitorios, entre los registrados se encuentran: Generales: fatiga, debilidad. Sistema nervioso central: somnolencia, dolor de cabeza. Aparato digestivo: vómito, sequedad de boca. Sistema cardiovascular: edema. Otros: dolor en sitio de inyección. Es necesario que frente a la aparición de cualquiera de estos efectos secundarios acudir al médico de forma inmediata. Fuentes Médicas Precio: Contáctenos 0181-83-11-01-64 Calificación: () Minimum Purchase: unit(s) Maximum Purchase: unit(s) Facebook Instagram Youtube Escanéé nuestro código QR para ver las redes sociales desde su teléfono. Meclizina. Piridoxina. Antiemético. Fco. Got. x 15ml. 25 /50mg Tab. x 12. Inv. Sol. Amp. x 5 x 1ml. Propiedades.Mecanismo de acción: La Meclozina es un derivado antihistamínico H1 que posee propiedades anticolinérgicas, antieméticas, antiespasmódicas, depresora del sistema nervioso central y anestésicas locales. El mecanismo de acción que explica los efectos antieméticos están relacionados a la inhibición del centro emético en el tronco cerebral, con poco o ningún efecto en la zona quimiorreceptora. La meclizina también reduce la excitabilidad de las neuronas en el núcleo vestibular y afectan las vías nerviosas que se originan en el laberinto. En el vértigo relacionado con el movimiento, los impulsos desde los receptores vestibulares son transmitidos al núcleo vestibular, a aéreas mas antiguas del cerebelo, y al área reticular del tronco cerebral;los efectos centrales anticolinérgicos de la meclizina inhibirian la actividad incrementada de las neuronas que responden a la acetilcolina en los núcleos vestibulares y las áreas reticulares, previniendo la activación del centro del vomito. Farmacocinetica: El comienzo de la acción de la meclizina es aproximadamente de 1 hora y el medicamento tiene una duración de acción prolongada con efectos que persisten de 8-24 horas después de la administración de una dosis única oral. El medicamento tiene una vida media plasmática de 6 horas. El camino metabólico de meclizina en humanos se desconoce. En ratas, meclizina es metabolizada (probablemente en el hígado) a norclorciclizina. Este metabolito es distribuido a través de casi todos los tejidos del cuerpo y cruza la placenta. El medicamento se excreta sin cambios en heces y en la orina como norclorciclizina. Indicaciones.Para la profilaxis y alivio sintomático de náuseas, vómito y vértigo. Dosificación.Mareos por viajes: Una dosis única de 25 a 50 mg de meclizina da protección contra el mareo por traslación por aproximadamente 24 horas. La dosis inicial debe tomarse una hora antes de iniciar el viaje para asegurar la absorción de la droga, pues en una persona que ya tenga síntomas de mareo no se puede estar seguro que el fármaco se va a retener. De ahí en adelante la dosis puede ser repetida cada 24 horas como se indica durante el transcurso del viaje. Laberintitis y trastornos vestibulares: La dosis óptima es usualmente de 25 a 100 mg diarios, dependiendo de la respuesta clínica. Náuseas y vómitos por radiación: 50 mg administrados de 2 a 12 horas antes de la radioterapia. Reacciones adversas.Han sido reportados somnolencia o sedación, sequedad de boca, fatiga, vómitos y dolor de cabeza. También visión borrosa, síntomas extrapiramidales y amnesia. Precauciones y advertencias.Como con todas las drogas administradas durante el embarazo, los riesgos posibles de que meclizina puede ocasionar somnolencia y que cuando sea utilizada, deben tomarse las precauciones necesarias cuando van a conducir u operar una maquinaria peligrosa. Los efectos depresores sobre el sistema nervioso central pueden ser incrementados con el uso concomitante de otros depresores del sistema nervioso central. Los pacientes que sufren de glaucoma o crecimiento prostático deberían tomar meclizina, únicamente bajo indicación médica. Como con todos los antihistamínicos, la meclizina puede causar hiperexcitabilidad en niños. Contraindicaciones.Conocida hipersensibilidad a la meclizina. Sinónimos.Vitamina B6. Píridoxal fosfato. Adermina hidroclorehidrato. Acción terapéutica.Suplemento nutricional. Propiedades.La piridoxina se convierte en los eritrocitos en fosfato de píridoxal, que actúa como coenzima en varios procesos metabólicos que afectan a las proteínas, a los hidratos de carbono y a los lípidos. Está implicada en la conversión del triptófano a ácido nicotínico o a serotonina. Las vitaminas se absorben en forma rápida en el tracto gastrointestinal, excepto en los síndromes de malabsorción. La piridoxina se absorbe principalmente en el yeyuno y no se une a las proteínas. El fosfato de píridoxal se une en su totalidad a las proteínas plasmáticas. Se metaboliza en el hígado. Su vida media es de 15 a 20 días y se excreta por vía renal. Indicaciones.Deficiencia vitamínica por una nutrición inadecuada o síndrome de malabsorción. La deficiencia de una sola vitamina B es rara, ya que en general la deficiencia es múltiple. La deficiencia de piridoxina puede producir aciduria xanturénica, problemas neurológicos, dermatitis seborreica y acnelosis. Algunos recién nacidos presentan un síndrome hereditario de dependencia de piridoxina y necesitan tomarla en la primera semana de vida, para evitar la anemia y el retraso mental;los signos son de hiperirritabilidad y ataques epileptiformes. Dosificación.Adultos: suplemento nutricional, síndrome de dependencia de piridoxina: 30mg a 600mg/día;mantenimiento: 50mg al día durante toda la vida. Suplemento dietético: 10mg a 20mg/día durante tres semanas, seguido de 2mg a 5mg/día durante varias semanas. Deficiencia inducida por fármacos: 10mg a 50mg/día para la causada por la penicilamina o de 100mg a 300mg/día para la causada por cicloserina, hidralazina o isoniazida. Alcoholismo: 50mg/día durante 2 a 4 semanas;si la anemia responde se debe continuar administrando piridoxina indefinidamente. Anemia sideroblástica hereditaria: 200 a 600mg/día durante 1 a 2 meses, seguidos de 30mg a 50mg/día durante toda la vida si fuera eficaz. Reacciones adversas.Rara vez produce toxicidad en personas con función renal normal. Las dosis de 200mg/día durante más de 30 días producen síndrome de dependencia de piridoxina. Las megadosis (2g a 6g diarios de piridoxina) durante varios meses han causado nefropatía sensorial severa que progresa desde marcha inestable con entumecimiento de los pies hasta torpeza en las manos; situación reversible con la suspensión de la piridoxina. Precauciones y advertencias.No usar las vitaminas como sustituto de una dieta equilibrada. Es importante no exceder la ración dietética recomendada. Fuentes dietéticas de piridoxina: carnes, bananas, papas y cereales integrales. La administración parenteral sólo se indicará en casos de intolerancia en la vía oral (náuseas, vómitos, síndrome de malabsorción). Interacciones.Los siguientes medicamentos pueden actuar como antagonistas de la piridoxina y producir anemia o neuritis periférica, o aumento de su excreción urinaria: cloranfenicol, cicloserina, hidralazina, adrenocorticoídes, azatioprina, cloramibucilo, ciclofosfamida, ciclosporina, mercaptopurina, isoniazida o penicilamina. Los estrógenos pueden aumentar las necesidades de piridoxina. No se recomienda el uso con levodopa, ya que los efectos antiparkinsonianos de la levodopa se revierten con 5mg de piridoxina (esto no ocurre con la asociación carbidopa-levodopa). Contraindicaciones.La relación riesgo-beneficio debe evaluarse en presencia de la enfermedad de Parkinson. Meclozina. Piridoxina. Antiemético. Fco. Got. x 15ml. 25 /50mg Tab. x 12. Inv. Sol. Amp. x 5 x 1ml. Propiedades.Mecanismo de acción: La Meclozina es un derivado antihistamínico H1 que posee propiedades anticolinérgicas, antieméticas, antiespasmódicas, depresora del sistema nervioso central y anestésicas locales. El mecanismo de acción que explica los efectos antieméticos están relacionados a la inhibición del centro emético en el tronco cerebral, con poco o ningún efecto en la zona quimiorreceptora. La meclizina también reduce la excitabilidad de las neuronas en el núcleo vestibular y afectan las vías nerviosas que se originan en el laberinto. En el vértigo relacionado con el movimiento, los impulsos desde los receptores vestibulares son transmitidos al núcleo vestibular, a aéreas mas antiguas del cerebelo, y al área reticular del tronco cerebral; los efectos centrales anticolinérgicos de la meclizina inhibirian la actividad incrementada de las neuronas que responden a la acetilcolina en los núcleos vestibulares y las áreas reticulares, previniendo la activación del centro del vomito. Farmacocinetica: El comienzo de la acción de la meclizina es aproximadamente de 1 hora y el medicamento tiene una duración de acción prolongada con efectos que persisten de 8-24 horas después de la administración de una dosis única oral. El medicamento tiene una vida media plasmática de 6 horas. El camino metabólico de meclizina en humanos se desconoce. En ratas, meclizina es metabolizada (probablemente en el hígado) a norclorciclizina. Este metabolito es distribuido a través de casi todos los tejidos del cuerpo y cruza la placenta. El medicamento se excreta sin cambios en heces y en la orina como norclorciclizina. Indicaciones.Para la profilaxis y alivio sintomático de náuseas, vómito y vértigo. Dosificación.Mareos por viajes: Una dosis única de 25 a 50 mg de meclizina da protección contra el mareo por traslación por aproximadamente 24 horas. La dosis inicial debe tomarse una hora antes de iniciar el viaje para asegurar la absorción de la droga, pues en una persona que ya tenga síntomas de mareo no se puede estar seguro que el fármaco se va a retener. De ahí en adelante la dosis puede ser repetida cada 24 horas como se indica durante el transcurso del viaje. Laberintitis y trastornos vestibulares: La dosis óptima es usualmente de 25 a 100 mg diarios, dependiendo de la respuesta clínica. Náuseas y vómitos por radiación: 50 mg administrados de 2 a 12 horas antes de la radioterapia. Reacciones adversas.Han sido reportados somnolencia o sedación, sequedad de boca, fatiga, vómitos y dolor de cabeza. También visión borrosa, síntomas extrapiramidales y amnesia. Precauciones y advertencias.Como con todas las drogas administradas durante el embarazo, los riesgos posibles de que meclizina puede ocasionar somnolencia y que cuando sea utilizada, deben tomarse las precauciones necesarias cuando van a conducir u operar una maquinaria peligrosa. Los efectos depresores sobre el sistema nervioso central pueden ser incrementados con el uso concomitante de otros depresores del sistema nervioso central. Los pacientes que sufren de glaucoma o crecimiento prostático deberían tomar meclizina, únicamente bajo indicación médica. Como con todos los antihistamínicos, la meclizina puede causar hiperexcitabilidad en niños. Contraindicaciones.Conocida hipersensibilidad a la meclizina. Sinónimos.Vitamina B6. Píridoxal fosfato. Adermina hidroclorehidrato. Acción terapéutica.Suplemento nutricional. Propiedades.La piridoxina se convierte en los eritrocitos en fosfato de píridoxal, que actúa como coenzima en varios procesos metabólicos que afectan a las proteínas, a los hidratos de carbono y a los lípidos. Está implicada en la conversión del triptófano a ácido nicotínico o a serotonina. Las vitaminas se absorben en forma rápida en el tracto gastrointestinal, excepto en los síndromes de malabsorción. La piridoxina se absorbe principalmente en el yeyuno y no se une a las proteínas. El fosfato de píridoxal se une en su totalidad a las proteínas plasmáticas. Se metaboliza en el hígado. Su vida media es de 15 a 20 días y se excreta por vía renal. Indicaciones.Deficiencia vitamínica por una nutrición inadecuada o síndrome de malabsorción. La deficiencia de una sola vitamina B es rara, ya que en general la deficiencia es múltiple. La deficiencia de piridoxina puede producir aciduria xanturénica, problemas neurológicos, dermatitis seborreica y acnelosis. Algunos recién nacidos presentan un síndrome hereditario de dependencia de piridoxina y necesitan tomarla en la primera semana de vida, para evitar la anemia y el retraso mental; los signos son de hiperirritabilidad y ataques epileptiformes. Dosificación.Adultos: suplemento nutricional, síndrome de dependencia de piridoxina: 30mg a 600mg/día; mantenimiento: 50mg al día durante toda la vida. Suplemento dietético: 10mg a 20mg/día durante tres semanas, seguido de 2mg a 5mg/día durante varias semanas. Deficiencia inducida por fármacos: 10mg a 50mg/día para la causada por la penicilamina o de 100mg a 300mg/día para la causada por cicloserina, hidralazina o isoniazida. Alcoholismo: 50mg/día durante 2 a 4 semanas; si la anemia responde se debe continuar administrando piridoxina indefinidamente. Anemia sideroblástica hereditaria: 200 a 600mg/día durante 1 a 2 meses, seguidos de 30mg a 50mg/día durante toda la vida si fuera eficaz. Reacciones adversas.Rara vez produce toxicidad en personas con función renal normal. Las dosis de 200mg/día durante más de 30 días producen síndrome de dependencia de piridoxina. Las megadosis (2g a 6g diarios de piridoxina) durante varios meses han causado nefropatía sensorial severa que progresa desde marcha inestable con entumecimiento de los pies hasta torpeza en las manos; situación reversible con la suspensión de la piridoxina. Precauciones y advertencias.No usar las vitaminas como sustituto de una dieta equilibrada. Es importante no exceder la ración dietética recomendada. Fuentes dietéticas de piridoxina: carnes, bananas, papas y cereales integrales. La administración parenteral sólo se indicará en casos de intolerancia en la vía oral (náuseas, vómitos, síndrome de malabsorción). Interacciones.Los siguientes medicamentos pueden actuar como antagonistas de la piridoxina y producir anemia o neuritis periférica, o aumento de su excreción urinaria: cloranfenicol, cicloserina, hidralazina, adrenocorticoídes, azatioprina, cloramibucilo, ciclofosfamida, ciclosporina, mercaptopurina, isoniazida o penicilamina. Los estrógenos pueden aumentar las necesidades de piridoxina. No se recomienda el uso con levodopa, ya que los efectos antiparkinsonianos de la levodopa se revierten con 5mg de piridoxina (esto no ocurre con la asociación carbidopa-levodopa). Contraindicaciones.La relación riesgo-beneficio debe evaluarse en presencia de la enfermedad de Parkinson. Este es un listado de algunos de los medicamentos, fármacos relacionados con VO-REMI . La vo remi para que sirve es una pregunta común entre quienes buscan alivio para los mareos y otros síntomas relacionados. La meclizina es un medicamento antihistamínico que se utiliza principalmente para prevenir y tratar los mareos y el vértigo. A continuación, exploraremos sus múltiples beneficios y usos. Prevención y tratamiento de mareos y vértigo La meclizina es eficaz en la prevención y tratamiento de mareos y vértigo, especialmente en personas que sufren de trastornos vestibulares. Su acción ayuda a estabilizar el equilibrio y reducir la sensación de inestabilidad. Alivio de náuseas y vómitos asociados con el movimiento Este medicamento también es útil para aliviar las náuseas y los vómitos que pueden ocurrir durante viajes en automóvil, barco o avión. La vo remi para que sirve se manifiesta en su capacidad para bloquear las señales que causan estas molestias. Tratamiento de los síntomas de la cinetosis La cinetosis, o mareo por movimiento, es una condición que afecta a muchas personas. La meclizina puede ser una solución efectiva para tratar los síntomas de esta afección, proporcionando un alivio significativo. Reducción de las náuseas durante el embarazo Durante el embarazo, muchas mujeres experimentan náuseas. La meclizina puede ser utilizada bajo supervisión médica para ayudar a reducir estas náuseas, mejorando así la calidad de vida de las futuras madres. Ayuda en el manejo de trastornos vestibulares Los trastornos vestibulares pueden causar mareos y problemas de equilibrio. La meclizina es una opción de tratamiento que puede ayudar a manejar estos síntomas, permitiendo a los pacientes llevar una vida más normal. Mejora de la tolerancia al movimiento Para las personas propensas a mareos, la meclizina puede mejorar la tolerancia al movimiento, permitiendo que realicen actividades cotidianas sin experimentar malestar. Uso en pacientes con mareos postoperatorios Después de una cirugía, algunos pacientes pueden experimentar mareos. La meclizina puede ser administrada para ayudar a aliviar estos síntomas, facilitando una recuperación más cómoda. Alivio de síntomas de ansiedad relacionados con mareos La ansiedad puede exacerbar los mareos. La meclizina puede ayudar a aliviar estos síntomas, proporcionando un efecto calmante que mejora el bienestar general del paciente. Efecto sinérgico de meclizina y piridoxina La combinación de meclizina y piridoxina ha mostrado un efecto sinérgico en el tratamiento de náuseas, lo que puede ser beneficioso para aquellos que sufren de mareos severos. Uso en pacientes con migrañas y mareos Los pacientes que sufren de migrañas a menudo experimentan mareos. La meclizina puede ser útil en el manejo de estos síntomas, proporcionando un alivio adicional durante los episodios de migraña. Tratamiento de trastornos del oído interno La meclizina puede ser utilizada en el tratamiento de trastornos del oído interno, que a menudo son responsables de los mareos y problemas de equilibrio. Mejora de la calidad de vida en problemas de equilibrio Al reducir los síntomas de mareo y vértigo, la meclizina puede mejorar significativamente la calidad de vida de las personas que padecen problemas de equilibrio. Enfoque integral para trastornos del sistema nervioso central La meclizina puede ser parte de un enfoque integral para el tratamiento de trastornos del sistema nervioso central, ayudando a manejar síntomas complejos que afectan la vida diaria. Inicio Vo-remi (Meclizina/Piridoxina) 25 mg/50 mg Caja con 12 Tabletas Atrás Laboratorios Offenbach Comparte Forma del producto\$ 36.00 IVA incluido Registro Sanitario COFEPRIS Compra segura Todas las compras están encryptadas y protegidas a través de Mercado Pago para brindarte total seguridad. Envío a domicilio Reciba su pedido el mismo día comprando antes de las 13:00 PM. Las compras posteriores a este horario se programan para entrega al siguiente día hábil. Si su medicamento requiere receta médica, deberá presentarla al momento de la entrega en el caso de los antibióticos. Las entregas locales en Guadalajara son válidas de lunes a sábado. No aplica en días festivos. Envíos nacionales Envío estándar: 3 a 5 días hábiles. * Envío exprés: 1 a 3 días hábiles. No realizamos envíos por paquetería de medicamentos antibióticos o aquellos que requieran de la retención de receta médica. Consulte nuestros Términos y Condiciones. Para mayor información sobre cobertura y disponibilidad, no dude en contactarnos. Código de barras: 7502004403557