I'm not a robot

Condiciones de prescripción y uso: Sin receta Estado: Autorizado Estado de comercialización: No comercializado Laboratorio: Bioprojet Ferrer Principios activos: Racecadotrilo Hidrasec es un medicamento que contiene racecadotrilo como principio activo. Está indicado en el tratamiento de los síntomas de la diarrea aguda inespecífica en adultos. Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 2 días. No tome Hidrasec Si es alérgico al racecadotrilo o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6). Advertencias y precauciones Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Hidrasec. Debe decirle a su médico si: - hay sangre o pus en sus deposiciones o si tiene fiebre. La causa de la diarrea puede ser una infección bacteriana que debe ser tratada por su médico, - tiene diarrea crónica o diarrea causada por antibióticos, - tiene una enfermedad de riñón o del hígado, - tiene vómitos prolongados o incontrolados, Si no se observa mejoría en 48 horas, interrumpa el tratamiento y consulte a su médico. Los pacientes con diarrea deben beber abundantes líquidos, para evitar la deshidratación que se manifiesta por sequedad de boca, sed excesiva, disminución de la cantidad de orina, piel arrugada, mareo, aturdimiento. Esto es especialmente importante en personas de edad avanzada. 1 Niños y adolescentes Hidrasec no debe ser utilizado en niños y adolescentes. Uso de Hidrasec con otros medicamentos Comunique a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento. Embarazo, lactancia y fertilidad No se recomienda el uso de Hidrasec si está embarazada o piensa que puede estarlo, o si está en periodo de lactancia. Conducción y uso de máquinas Hidrasec tiene poco efecto, o no tiene, en la capacidad de conducir o manejar maquinaria. Información importante sobre algunos de los componentes de Hidrasec Hidrasec contiene lactosa. Si su médico le ha dicho que tiene intolerancia a algunos azúcares, pregunte a su médico antes de tomar Hidrasec. Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico, o farmacéutico. En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico. La dosis recomendada es de una cápsula (100 mg) tres veces al día que debe tragarse acompañada de un vaso de agua. Hidrasec debe tomarse preferentemente antes de las comidas principales pero, para empezar con su tratamiento, puede tomar una cápsula de Hidrasec en cualquier momento del día. El tratamiento debe mantenerse hasta que se produzcan 2 deposiciones normales. La duración máxima del tratamiento será de 2 días. Para compensar la pérdida de líquido debido a su diarrea, este medicamento debe usarse junto con una restitución adecuada de fluidos y sales (electrolitos). La mejor restitución de los fluidos y las sales se consigue con una solución llamada de rehidratación oral (por favor, pregunte a su médico o farmacéutico si no está seguro). No se requiere el ajuste de la dosis en personas de edad avanzada. Uso en niños y adolescentes Los niños y adolescentes no pueden tomar este medicamento. Si toma más Hidrasec del que debe Si toma más Hidrasec del que debiera, por favor, contacte inmediatamente con su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte a su médico o farmacéutico, o llame al Servicio de Información Toxicológica, Teléfono 91 562 04 20 (indicando el medicamento y la cantidad ingerida). 2 Si olvidó tomar Hidrasec No tome una dosis doble para compensar una dosis olvidada. Simplemente continúe con el tratamiento. Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. El efecto adverso más frecuente es dolor de cabeza (afecta a entre 1 y 10 de cada 100 pacientes). Se han descrito los siguientes efectos adversos poco frecuentes (afectan a entre 1 y 10 de cada 1.000 pacientes): erupción y eritema (enrojecimiento de la piel). Otros efectos adversos de frecuencia desconocida (la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles) son: eritema multiforme (lesiones rojizas en las extremidades e interior de la boca), hinchazón de lengua, hinchazón de cara, hinchazón de los labios, hinchazón de los párpados, angioedema (hinchazón bajo la piel en diversas partes del cuerpo), urticaria, eritema nodoso (inflamación en forma de bultos bajo la piel), erupción papular (erupción en la piel con lesiones pequeñas, duras y abultadas), prurigo (lesiones en la piel con picor), prurito (picor generalizado) y erupción tóxica de la piel. Deje de tomar Hidrasec y contacte inmediatamente con un médico si experimenta síntomas de angioedema, como: hinchazón de la cara, lengua o faringe dificultad para tragar ronchas y dificultad para respirar Comunicación de efectos adversos Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano Website: www.notificaRAM.es. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento. Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños. No utilice Hidrasec después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica. Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente. No requiere condiciones especiales de conservación. 3 Composición de Hidrasec La sustancia activa es racecadotrilo. Cada cápsula contiene 100 mg de racecadotrilo. Los demás componentes son lactosa, almidón de maíz pregelatinizado, estearato de magnesio y sílice coloidal anhidra. La cápsula contiene gelatina, óxido de hierro amarillo (E 172) y dióxido de titanio (E171). Aspecto de Hidrasec y contenido del envase Hidrasec se presenta en forma de cápsulas duras de color marfil. Cada envase contiene 6 ó 10 cápsulas duras. Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación Titular de la autorización de comercialización BIOPROJET-FERRER, S.L. Gran Vía Carlos III, 94 08028 Barcelona (España) Responsable de la fabricación FERRER INTERNACIONAL, S.A. Joan Buscalla 1-9 08173 Sant Cugat del Valles, Barcelona (España) o SOPHARTEX, 21 rue de Pressoir, 28500 Vernouillet (Francia) Este prospecto ha sido aprobado en febrero de 2014 La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) www.aemps.gob.es. 4 La diarrea aguda es un problema común en adultos, y puede ser causada por diversas razones, como infecciones virales o bacterianas, consumo de alimentos contaminados o intolerancias alimentarias. Uno de los medicamentos que se utiliza para tratar los síntomas de la diarrea aguda inespecífica en adultos es el Hidrasec. En este artículo, te proporcionaremos información detallada sobre este medicamento, desde su composición hasta las precauciones y recomendaciones para su uso. «Cuando la diarrea aparece, es importante tomar las medidas adecuadas para aliviar los síntomas y prevenir la deshidratación.» Resumen detallado del prospecto de Hidrasec Nombre del medicamento Hidrasec Principio activo Racecadotrilo Indicación Tratamiento de los síntomas de la diarrea aguda inespecífica en adultos Dosis recomendada Una cápsula (100 mg) tres veces al día, antes de las comidas principales Duración del tratamiento Hasta que se produzcan 2 deposiciones normales, no excediendo los 2 días Posibles efectos adversos Dolor de cabeza, erupción y eritema en la piel 1. Qué es Hidrasec y para qué se utiliza Hidrasec es un medicamento que contiene racecadotrilo como principio activo. Este medicamento está indicado en el tratamiento de los síntomas de la diarrea aguda inespecífica en adultos. La diarrea aguda inespecífica se refiere a la diarrea de inicio rápido y corta duración, sin una causa específica identificable. El racecadotrilo actúa inhibiendo la enzima encefalinasa, lo que ayuda a reducir la cantidad y la consistencia de las deposiciones diarreicas, aliviando así los síntomas. Si experimentas diarrea aguda inespecífica, es importante que consultes a un médico antes de iniciar el tratamiento con Hidrasec. 2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Hidrasec Antes de empezar a tomar Hidrasec, es importante que tengas en cuenta ciertas precauciones y condiciones. No debes tomar Hidrasec si eres alérgico al racecadotrilo o a cualquiera de los demás componentes del medicamento. Si tienes alguna alergia conocida, asegúrate de informar a tu médico antes de iniciar el tratamiento. Además, es recomendable que consultes a tu médico o farmacéutico antes de tomar Hidrasec si presentas los siguientes síntomas o condiciones: Sangre o pus en las deposiciones Fiebre Diarrea crónica Enfermedad de riñón o del hígado Vómitos prolongados o incontrolados Se han reportado reacciones en la piel, como erupciones, con el uso de Hidrasec. En caso de observar cualquier cambio en la piel, es recomendable interrumpir el tratamiento y consultar a un médico. Si no experimentas mejoría en tus síntomas después de 48 horas de haber iniciado el tratamiento, es importante que te pongas en contacto con tu médico. Para prevenir la deshidratación, es recomendable beber abundantes líquidos cuando se padece de diarrea. Si tienes alguna duda sobre las precauciones a tener en cuenta antes de tomar Hidrasec, no dudes en consultar a tu médico o farmacéutico. 3. Cómo tomar Hidrasec Para obtener los mejores resultados con Hidrasec, es importante seguir las instrucciones de administración del medicamento. Las siguientes son las recomendaciones generales para tomar Hidrasec: La dosis recomendada es de una cápsula (100 mg) tres veces al día. Se debe tomar Hidrasec con un vaso de agua. Es recomendable tomar Hidrasec antes de las comidas principales. Al iniciar el tratamiento, se puede tomar Hidrasec en cualquier momento del día. El tratamiento debe mantenerse hasta que se produzcan 2 deposiciones normales, no debiendo exceder los 2 días. Es recomendable utilizar una solución de rehidratación oral junto con Hidrasec para compensar la pérdida de líquidos causada por la diarrea. No se requiere ajuste de dosis en personas de edad avanzada. Es importante seguir las recomendaciones de tu médico o farmacéutico sobre cómo tomar Hidrasec. Si tienes alguna duda, no dudes en consultarlo con ellos. 4. Posibles efectos adversos Al igual que todos los medicamentos, Hidrasec puede producir efectos adversos en algunas personas, aunque no todas los sufran. Los efectos adversos más comunes reportados incluyen dolor de cabeza, erupción y eritema en la piel. Es importante comunicar cualquier efecto adverso que experimentes durante el tratamiento con Hidrasec a tu médico o farmacéutico. En caso de experimentar síntomas de angioedema, como hinchazón de la cara, lengua o faringe, dificultad para tragar, ronchas y dificultad para respirar, debes suspender el uso de Hidrasec y contactar a un médico de inmediato. Recuerda que esta no es una lista exhaustiva de los posibles efectos adversos. En caso de experimentar cualquier otro síntoma o efecto adverso, es importante que lo comuniques a tu médico o farmacéutico. 5. Conservación de Hidrasec Para garantizar la eficacia y seguridad de Hidrasec, es importante seguir las recomendaciones de conservación del medicamento. Las siguientes son las recomendaciones generales: Mantén este medicamento fuera del alcance de los niños. No utilices Hidrasec después de la fecha de caducidad indicada en la caja. Los medicamentos no se deben tirar a la basura. Depósitalos en el Punto SIGRE de la farmacia para su correcta eliminación. Si tienes alguna duda sobre la conservación de Hidrasec, no dudes en consultarlo con tu farmacéutico. 6. Contenido del envase e información adicional Hidrasec se presenta en cápsulas duras de color marfil. Cada envase contiene 6 o 10 cápsulas duras. Además del racecadotrilo como sustancia activa, los demás componentes de Hidrasec incluyen lactosa, almidón de maíz pregelatinizado, estearato de magnesio y sílice coloidal anhidra. Para obtener información detallada y actualizada sobre Hidrasec, puedes visitar la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Preguntas frecuentes 1. ¿Cómo prevenir la diarrea aguda? La prevención de la diarrea aguda implica medidas como el lavado de manos frecuente, especialmente antes de comer y después de ir al baño. También es importante consumir alimentos cocidos adecuadamente, evitar el consumo de alimentos crudos o en mal estado, y mantener una buena higiene en la preparación de los alimentos. 2. ¿Cuáles son los alimentos recomendados durante la diarrea aguda? Durante la diarrea aguda, es recomendable consumir alimentos de fácil digestión y que ayuden a reponer los nutrientes perdidos. Algunos alimentos recomendados incluyen plátanos, arroz blanco, galletas saladas, caldo de pollo y yogurt natural. 3. ¿Existen remedios naturales para aliviar la diarrea? Algunos remedios naturales que pueden ayudar a aliviar la diarrea incluyen la ingesta de líquidos claros como el caldo de pollo, la manzanilla o el té de jengibre. También se recomienda consumir alimentos ricos en fibra soluble, como la avena y las manzanas. 4. ¿Cuándo debo consultar a un médico por diarrea persistente? Debes consultar a un médico si experimentas diarrea persistente que dura más de 48 horas, si tienes fiebre alta, sangre en las deposiciones o si presentas signos de deshidratación, como sequedad de boca, disminución de la producción de orina y mareos. 5. ¿Cuáles son las recomendaciones para una hidratación adecuada durante la diarrea? Es importante beber abundantes líquidos para prevenir la deshidratación durante la diarrea. Se recomienda consumir agua, soluciones de rehidratación oral y líquidos claros como caldos de pollo y té suave. Evita las bebidas con cafeína, alcohol y azúcares añadidos, ya que pueden empeorar los síntomas de la diarrea. Conclusión: Hidrasec es un medicamento utilizado para el tratamiento de la diarrea aguda inespecífica en adultos. Contiene racecadotrilo como principio activo y actúa reduciendo la cantidad y la consistencia de las deposiciones diarreicas. Antes de tomar Hidrasec, es importante consultar a un médico o farmacéutico para asegurarse de que el medicamento sea adecuado para ti. Sigue las instrucciones de administración del medicamento y comunica cualquier efecto adverso a tu médico. Recuerda que la prevención y la hidratación adecuada son fundamentales para el manejo de la diarrea aguda. Fuente de la información: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios cima.aemps.es Hidrasec es un medicamento antidiarreico utilizado para condiciones no crónicas de este padecimiento. Funciona mediante la regulación de agua a los intestinos. Nombres Comerciales: Hidrasec Nombre Genérico: Racecadotrilo Presentaciones y Vía de Administración: Cápsulas y granulado para administración oral. Sus usos más frecuentes son para: Diarrea Sus usos en general son: Diarrea aguda, es decir, la que tiene una duración inferior a dos semanas. La diarrea puede representar problemas graves de deshidratación, por lo que debe acompañarse el medicamento con el uso de sueros orales cuando se sospeche que pudiera presentarse esta condición. Siga las instrucciones de su médico para una pronta recuperación. Hidrasec Precio Para encontrar el mejor precio de Hidrasec compara varias farmacias en nuestra próxima sección. Precio Farmacias Chedraui Farmatodo Farmacias San Pablo Farmalisto Cápsulas $182 $180 $180 $174 Sobres – $229.50 $209 $207 **Es importante aclarar que estos precios fueron tomados de la farmacia en línea en una investigación hecha por el equipo de quefarmacia en Marzo 2020, los precios pueden modificarse con el tiempo y la sucursal de la farmacia.** Ambas presentaciones de ese medicamento las consigues más económicas en Farmalisto, quién en comparación con otras farmacias, para las cápsulas se encuentra hasta un 8% más accesibles, y en la presentación en sobres te puedes ahorrar hasta el 20% en comparación con Farmatodo. Presentaciones y forma de administración Cápsulas de 100 mg de Racecadotrilo, en cajas de 6 o 9 piezas. Son fabricadas por Laboratorios Ferrer en la marca comercial Hidrasec. Granulado de 10 y 30 mg de Racecadotrilo. Viene en cajas con 18 sobres. Es fabricado por Laboratorios Ferrer en la marca comercial Hidrasec . Dosis y usos recomendados por edad Presentación 3 meses a 12 años Adultos Veces al día Cápsulas No 100 mg 3 Granulado 10 a 60 mg No 3 *Consulta a tu médico para recibir la dosis correcta. El granulado se puede disolver en agua, combinarse con algún alimento o usar directamente en la boca del niño. Si no se observan resultados en 5 días, consulte nuevamente a su médico. El tratamiento para pacientes adultos es de un máximo de 7 días. La dosis máxima para adultos es de 400 mg al día. En niños es de 8 mg por kg. Generales. Precaución en personas intolerantes a la fructosa, con ausencia de las enzimas sacarasa e isomaltasa, insuficiencia renal o con síndrome de mala absorción de glucosa y galactosa. Alergias o hipersensibilidad. No se use en personas alérgicas al medicamento. Mezcla con alcohol. El alcohol irrita al aparato digestivo. Además, el alcohol deshidrata el organismo, lo que puede generar complicaciones al combinarse con los efectos de la diarrea. Mezclar con otros medicamentos. No se tiene conocimiento hasta la fecha de interacciones con medicamentos. Combinación de Hidrasec en embarazo y lactancia EMBARAZO MEDIO LACTANCIA BAJO RIESGO BAJO Hidrasec, por su ingrediente activo Racecadotrilo, no ha sido clasificado por la FDA (Food & Drug Administration). No se recomienda su uso durante el embarazo por no contarse con estudios en humanos, aunque las pruebas en animales no indican problemas. Según estudios médicos de e-lactancia.org, Hidrasec es compatible con la lactancia y lo considera de muy bajo riesgo. Es además un medicamento apropiado para pediatría, aunque no se tienen estudios suficientes en menores de 3 meses. Efectos secundarios Los efectos secundarios por el uso de este medicamento son mínimos y son similares a los que se obtienen con el uso de placebos. Estos son: Es importante de todas maneras reportar cualquier síntoma al médico. Preste especial atención a los síntomas que pudieran indicar una reacción anafiláctica, es decir, una respuesta alérgica inmediata al medicamento. Estos generalmente se manifiestan con la hinchazón de la cara y la garganta, además de labios y lengua. Fuentes Médicas Hidrasec es un medicamento antidiarreico utilizado para condiciones no crónicas de este padecimiento. Funciona mediante la regulación de agua a los intestinos. Nombres Comerciales: Hidrasec Nombre Genérico: Racecadotrilo Presentaciones y Vía de Administración: Cápsulas y granulado para administración oral. Sus usos más frecuentes son para: Diarrea Sus usos en general son: Diarrea aguda, es decir, la que tiene una duración inferior a dos semanas. La diarrea puede representar problemas graves de deshidratación, por lo que debe acompañarse el medicamento con el uso de sueros orales cuando se sospeche que pudiera presentarse esta condición. Siga las instrucciones de su médico para una pronta recuperación. Hidrasec Precio Para encontrar el mejor precio de Hidrasec compara varias farmacias en nuestra próxima sección. Precio Farmacias Chedraui Farmatodo Farmacias San Pablo Farmalisto Cápsulas $182 $180 $180 $174 Sobres – $229.50 $209 $207 **Es importante aclarar que estos precios fueron tomados de la farmacia en línea en una investigación hecha por el equipo de quefarmacia en Marzo 2020, los precios pueden modificarse con el tiempo y la sucursal de la farmacia.** Ambas presentaciones de ese medicamento las consigues más económicas en Farmalisto, quién en comparación con otras farmacias, para las cápsulas se encuentra hasta un 8% más accesibles, y en la presentación en sobres te puedes ahorrar hasta el 20% en comparación con Farmatodo. Presentaciones y forma de administración Cápsulas de 100 mg de Racecadotrilo, en cajas de 6 o 9 piezas. Son fabricadas por Laboratorios Ferrer en la marca comercial Hidrasec. Granulado de 10 y 30 mg de Racecadotrilo. Viene en cajas con 18 sobres. Es fabricado por Laboratorios Ferrer en la marca comercial Hidrasec . Dosis y usos recomendados por edad Presentación 3 meses a 12 años Adultos Veces al día Cápsulas No 100 mg 3 Granulado 10 a 60 mg No 3 *Consulta a tu médico para recibir la dosis correcta. El granulado se puede disolver en agua, combinarse con algún alimento o usar directamente en la boca del niño. Si no se observan resultados en 5 días, consulte nuevamente a su médico. El tratamiento para pacientes adultos es de un máximo de 7 días. La dosis máxima para adultos es de 400 mg al día. En niños es de 8 mg por kg. Generales. Precaución en personas intolerantes a la fructosa, con ausencia de las enzimas sacarasa e isomaltasa, insuficiencia renal o con síndrome de mala absorción de glucosa y galactosa. Alergias o hipersensibilidad. No se use en personas alérgicas al medicamento. Mezcla con alcohol. El alcohol irrita al aparato digestivo. Además, el alcohol deshidrata el organismo, lo que puede generar complicaciones al combinarse con los efectos de la diarrea. Mezclar con otros medicamentos. No se tiene conocimiento hasta la fecha de interacciones con medicamentos. Combinación de Hidrasec en embarazo y lactancia EMBARAZO MEDIO LACTANCIA BAJO RIESGO BAJO Hidrasec, por su ingrediente activo Racecadotrilo, no ha sido clasificado por la FDA (Food & Drug Administration). No se recomienda su uso durante el embarazo por no contarse con estudios en humanos, aunque las pruebas en animales no indican problemas. Según estudios médicos de e-lactancia.org, Hidrasec es compatible con la lactancia y lo considera de muy bajo riesgo. Es además un medicamento apropiado para pediatría, aunque no se tienen estudios suficientes en menores de 3 meses. Efectos secundarios Los efectos secundarios por el uso de este medicamento son mínimos y son similares a los que se obtienen con el uso de placebos. Estos son: Es importante de todas maneras reportar cualquier síntoma al médico. Preste especial atención a los síntomas que pudieran indicar una reacción anafiláctica, es decir, una respuesta alérgica inmediata al medicamento. Estos generalmente se manifiestan con la hinchazón de la cara y la garganta, además de labios y lengua. Fuentes Médicas Al igual que todos los medicamentos, HIDRASEC puede modificar o ver modificado su efecto como consecuencia de otras sustancias, incluyendo otros medicamentos, alimentos, tabaco o alcohol. Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica, homeopáticos, plantas medicinales y otros productos relacionados con la salud, ya que puede ser necesario interrumpir el tratamiento o ajustar la dosis de alguno de ellos. El medicamento HIDRASEC 100 MG CAPSULAS DURAS es utilizado en el tratamiento de diversas afecciones gastrointestinales, como la diarrea aguda o crónica. Es importante seguir las indicaciones de dosificación adecuadas para garantizar su efectividad y minimizar los riesgos de efectos secundarios. Dosificación en niños La dosis de HIDRASEC 100 MG CAPSULAS DURAS en niños varía según su peso y la gravedad de la diarrea. Se recomienda consultar con un pediatra antes de administrar este medicamento a niños. Para niños menores de 12 meses: Consultar con el pediatra para determinar la dosis adecuada. Para niños de 1 a 12 años: La dosis usual es de 1 cápsula cada 8 horas. Dosificación en embarazadas Las mujeres embarazadas deben consultar con su médico antes de tomar HIDRASEC 100 MG CAPSULAS DURAS, ya que puede afectar al feto. En caso de ser necesario, el médico determinará la dosis adecuada considerando el riesgo-beneficio para la madre y el bebé. Dosificación en adolescentes Para adolescentes mayores de 12 años, la dosis usual de HIDRASEC 100 MG CAPSULAS DURAS es de 1 cápsula cada 8 horas. Es importante seguir las indicaciones del médico para evitar complicaciones. Dosificación en ancianos En pacientes ancianos, se recomienda ajustar la dosis de HIDRASEC 100 MG CAPSULAS DURAS según la función renal y hepática. Es importante seguir las indicaciones del médico para evitar efectos adversos. Consideraciones adicionales Para hombres y mujeres adultos, la dosis usual de HIDRASEC 100 MG CAPSULAS DURAS es de 1 cápsula cada 8 horas. Es importante no exceder la dosis recomendada y seguir las indicaciones del médico. En casos de sobredosis o efectos secundarios, se recomienda acudir al médico de forma inmediata para recibir atención médica adecuada. Hidrasec es un medicamento antidiarreico utilizado para condiciones no crónicas de este padecimiento. Funciona mediante la regulación de agua a los intestinos. Nombres Comerciales: Hidrasec Nombre Genérico: Racecadotrilo Presentaciones y Vía de Administración: Cápsulas y granulado para administración oral. Sus usos más frecuentes son para: Diarrea Sus usos en general son: Diarrea aguda, es decir, la que tiene una duración inferior a dos semanas. La diarrea puede representar problemas graves de deshidratación, por lo que debe acompañarse el medicamento con el uso de sueros orales cuando se sospeche que pudiera presentarse esta condición. Siga las instrucciones de su médico para una pronta recuperación. Hidrasec Precio Para encontrar el mejor precio de Hidrasec compara varias farmacias en nuestra próxima sección. Precio Farmacias Chedraui Farmatodo Farmacias San Pablo Farmalisto Cápsulas $182 $180 $180 $174 Sobres – $229.50 $209 $207 **Es importante aclarar que estos precios fueron tomados de la farmacia en línea en una investigación hecha por el equipo de quefarmacia en Marzo 2020, los precios pueden modificarse con el tiempo y la sucursal de la farmacia.** Ambas presentaciones de ese medicamento las consigues más económicas en Farmalisto, quién en comparación con otras farmacias, para las cápsulas se encuentra hasta un 8% más accesibles, y en la presentación en sobres te puedes ahorrar hasta el 20% en comparación con Farmatodo. Presentaciones y forma de administración Cápsulas de 100 mg de Racecadotrilo, en cajas de 6 o 9 piezas. Son fabricadas por Laboratorios Ferrer en la marca comercial Hidrasec. Granulado de 10 y 30 mg de Racecadotrilo. Viene en cajas con 18 sobres. Es fabricado por Laboratorios Ferrer en la marca comercial Hidrasec . Dosis y usos recomendados por edad Presentación 3 meses a 12 años Adultos Veces al día Cápsulas No 100 mg 3 Granulado 10 a 60 mg No 3 *Consulta a tu médico para recibir la dosis correcta. El granulado se puede disolver en agua, combinarse con algún alimento o usar directamente en la boca del niño. Si no se observan resultados en 5 días, consulte nuevamente a su médico. El tratamiento para pacientes adultos es de un máximo de 7 días. La dosis máxima para adultos es de 400 mg al día. En niños es de 8 mg por kg. Generales. Precaución en personas intolerantes a la fructosa, con ausencia de las enzimas sacarasa e isomaltasa, insuficiencia renal o con síndrome de mala absorción de glucosa y galactosa. Alergias o hipersensibilidad. No se use en personas alérgicas al medicamento. Mezcla con alcohol. El alcohol irrita al aparato digestivo. Además, el alcohol deshidrata el organismo, lo que puede generar complicaciones al combinarse con los efectos de la diarrea. Mezclar con otros medicamentos. No se tiene conocimiento hasta la fecha de interacciones con medicamentos. Combinación de Hidrasec en embarazo y lactancia EMBARAZO MEDIO LACTANCIA BAJO RIESGO BAJO Hidrasec, por su ingrediente activo Racecadotrilo, no ha sido clasificado por la FDA (Food & Drug Administration). No se recomienda su uso durante el embarazo por no contarse con estudios en humanos, aunque las pruebas en animales no indican problemas. Según estudios médicos de e-lactancia.org, Hidrasec es compatible con la lactancia y lo considera de muy bajo riesgo. Es además un medicamento apropiado para pediatría, aunque no se tienen estudios suficientes en menores de 3 meses. Efectos secundarios Los efectos secundarios por el uso de este medicamento son mínimos y son similares a los que se obtienen con el uso de placebos. Estos son: Es importante de todas maneras reportar cualquier síntoma al médico. Preste especial atención a los síntomas que pudieran indicar una reacción anafiláctica, es decir, una respuesta alérgica inmediata al medicamento. Estos generalmente se manifiestan con la hinchazón de la cara y la garganta, además de labios y lengua. Fuentes Médicas HIDRASEC C►psulas | Comprar FERRER